

Recomandări privind prevenirea și combaterea bolilor în perioada de pârgă

Perioada 08 – 11 septembrie 2025 – specialiștii din cadrul secției Imunologie și Protecția Plantelor Horticole a INCAAMV au efectuat controale fitosanitare în plantațiile horticole din sudul și centrul Republicii Moldova. Verificările au avut loc în perioada de pârgă, la acumularea unui conținut de zahăr de 12–15% în boabe, pentru prevenirea apariției și dezvoltării ciupercii *Botrytis cinerea*.

Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu)

Este una dintre cele mai periculoase boli ale viței de vie, mai ales în perioada de pârgă. Infecția poate afecta cantitatea și calitatea producției de struguri la soiurile de masă și pentru vin în proporție de până la 100%.

Profilaxie și combatere

- Soiuri sensibile: Chardonnay, Sauvignon, Aligote.
- Metodă recomandată: desfrunzirea parțială manuală a butucilor înainte de tratamente, la acumularea a 12–15 % zahăr în boabe.

Beneficii ale desfrunzirii:

- creează condiții defavorabile pentru dezvoltarea putregaiului cenușiu;
- micșorează intensitatea bolii (de 2 ori);
- sporește eficacitatea produselor utilizate;
- reduce numărul de tratamente necesare.



Figura 1. Desfrunzirea parțială a butucilor (fotografii ilustrative).

Tratamente recomandate

Putregai cenușiu – soiuri de masă (7 zile înainte de păstrarea îndelungată)

Produs	Doză
Ciprodinil + Fludioxonil	0,75–1,0 l/ha
Fenhexamid	1,0–1,5 kg/ha

Mana și bacterioze – înainte și după recoltare

Produs pe bază de cupru	Doză
Sulfat de cupru tribazic 345 g/l	3,0–5,0 l/ha
Sulfat de cupru tribazic 400 g/kg	2,5 kg/ha
Oxiclorură de cupru 840 g/kg	2,5–3,0 kg/ha
Sulfat de cupru + uree + amofos (181+130+100 g/l)	4,0 l/ha
Amestec de Bordeaux (810 g/l)	4,0–5,0 l/ha
Sulfat de cupru 200 g/kg	5,0 kg/ha
Sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid de Ca 770 g/kg	5,0 kg/ha
Hidroxid de cupru 576 g/kg	2,3–3,0 kg/ha
Hidroxid de cupru + sulf (150+300 g/l)	5,0–7,0 l/ha

Beneficii: tratamentele contribuie la coacerea mai bună a lemnului și la sporirea rezistenței organelor butucului la temperaturile critice din iernile geroase.

Făinarea viței de vie

- Soiuri sensibile: cu coacere tardivă și cu coacere neuniformă (Muscat de Hamburg, Italia ș.a.).
- Produs recomandat: Sulf WG, WDG 800 g/l (3,0–6,0 kg/ha).
- Interval de pauză: 4–5 zile înainte de recoltare.

Molia verde a viței de vie (*Lobesia botrana*)

În perioada de pârgă nu s-au înregistrat zboruri semnificative. Generația a treia este cea mai periculoasă în toamnele calde și umede.

Observații: zborul fluturilor (20–25 indivizi/diurnă) a fost detectat între 1–5 septembrie 2025 în sud (r-n Cahul, r-n Cantemir). Pragul economic de daună: 10 ouă/larve la 100 ciorchini.

Măsuri recomandate:

- Aplicarea produselor autorizate în Registrul de Stat, ex. Benzoat de emamectin 200 g/kg (0,1–0,15 kg/ha).
- Interval de pauză: 7 zile înainte de recoltare.